



Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Προστασίας
Hellenic Society of Cardiovascular Prevention

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σύγχρονες Απόψεις στην Διαχείριση Παραγόντων Κινδύνου για Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

25 - 27 Νοεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο Vitina House

BYTINA



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος **Χ. Γράσσο**

Αντιπρόεδρος **Α. Πιτταράς**

Ταμίας **Κ. Λαμπρόπουλος**

Μέλη **Θ. Γιαλέρνιος**
Μ. Παπαβασιλείου
Σ. Παπαϊωάννου
Α. Τριανταφύλλου

Πληροφορίες - Γραμματεία:
ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Congress World

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-72 22 518, 210 72 10 069
<http://www.congressworld.gr>,
e-mail: info@congressworld.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Προστασίας (ΕΕΚΠ) έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο μας, στην όμορφη και ιστορική πόλη της Βυτίνας, με κύριο θέμα: «Η επαναφορά της κανονικότητας στην καθημερινή κλινική πράξη: Η σύγχρονη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου και η πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειοεμφρικών νόσων».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συναδέλφων επαγγελματιών υγείας, επιλέξαμε σύγχρονη θεματολογία, βασισμένη σε προβλήματα της καθημερινής κλινικής πράξης, με σύγχρονες απόψεις και γνώσεις, με γνώμονα την ιατρική των αποδείξεων και την ενεργό συμμετοχή.

Η παρουσία ικανών και έμπειρων ομιλητών, είναι επιστημονική πρόκληση για τη δική σας ενεργό συμμετοχή, που πιστεύουμε ότι είναι το απαραίτητο εχέγγυο για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Με τιμή

Χαράλαμπος Γράσσος

Καρδιολόγος, Ειδικός Υπερτασιολόγος ESH
Διευθυντής Καρδιολογική Κλινική ΓΝ ΚΑΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Προστασίας

25-27 Νοεμβρίου 2022, ΒΥΤΙΝΑ

*«Σύγχρονες απόψεις στην διαχείριση παραγόντων
κινδύνου για πρόληψη και αντιμετώπιση
των καρδιαγγειακών παθήσεων»*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

14:00-16:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η διαχείριση της υπέρτασης στους αθλητές

A. Πιτταράς, Χ. Γράσσο

Συζήτηση-Σχόλια-Ερωτήσεις

16:00-17:00 CLINICAL WORKSHOP

Chair: A. Pittaras

The role of exercise and physical fitness in
cardiovascular disease continuum

P. Kokkinos

Συζήτηση-Σχόλια-Ερωτήσεις

17:00-17:45 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

Πρόεδροι: A. Πιτταράς, I. Καψοκόλης

Οι νεότερες οδηγίες εκτίμησης αναπηρίας καρδιαγγειοεμφρικού
ασθενούς από τα ΚΕΠΑ

A. Πιτταράς, Γ. Καρακατσάνης, I. Ορέστης

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

17:45-18:45 ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόεδροι: **Σ. Παπαϊωάννου, Ν. Κουρεμένος**

17:45-18:15 β-αποκλειστές: αδικημένη ετερογενής ομάδα πρώτης επιλογής ή ενιαίο σύνολο τελευταίας επιλογής. Η θέση τους στις κατευθυντήριες οδηγίες συνδυασμένης θεραπείας

Ε. Καλλίστρατος

Σχόλια: **Ι. Ζαχαροπούλου**

18:15-18:45 Διαχείριση του θωρακικού άλγους. Νεότερα δεδομένα
Ν. Μάτσας

Σχόλια: **Α. Μαντάς**

18:45-20:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η διάγνωση και διαχείριση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες

Πρόεδρος: **Α. Καραβίδας**

Α) Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Α. Πιτταράς

Β) Καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Χ. Γράσσο

Σχόλια: **Α. Νέγκου, Ι. Πασιάς, Δ. Φανουράκης, Δ. Φλέσσας**

20:00-21:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η διαχείριση της αντιπηκτικής αγωγής στην κολπική μαρμαρυγή

Πρόεδρος: **Κ. Κυφνίδης**

Νεότερα αντιπηκτικά – Προβληματισμοί στην κλινική χρήση τους

Α. Πιτταράς

Σχόλια–Ερωτήσεις: **Θ. Γιαλέρνιος, Λ. Στεργίου**

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

09:00-10:30 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόεδροι: **Μ. Παπαβασιλείου**

09:00-09:30 Ο ρόλος του υπερηχοκαρδιογραφήματος στον προαθλητικό έλεγχο.
Σε όλους;

Α. Τσούκας

09:30-10:00 Ψυχικές διαταραχές σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα:
Ατομική και οικογενειακή διαχείριση

Ο. Ανδρεοπούλου-Κυπραίου

10:00-10:30 Νεότερα καπνικά προϊόντα και ο ρόλος τους στη διακοπή του καπνίσματος
Χ. Γράσσο

Σχόλια: **Α. Τσαντούλας, Ν. Μάτσας**

10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Ε. Καλλίστρατος**

Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου

Λ. Πουλημένος

Σχόλια: **Δ. Φανουράκης**

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Ε. Σκληρός**

Ο καθημερινός ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη
και καρδιομεταβολικές συννοσηρότητες

Ι. Κυριαζής

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Κ. Κυπραίος**

Κλινικές αποδείξεις για τα προτεινόμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση
της COVID -19

Γ. Παναγιωτακόπουλος

12:30-13:00: ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Κ. Κυφνίδης**

Η αξιολόγηση των επιπέδων της HDL-C από τον κλινικό ιατρό.
Από τη θεωρία στην πράξη

Κ. Κυπραίος

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Α. Πιτταράς**

Η πρακτική κλινική διαχείριση του ασθενούς με νεφρική δυσλειτουργία
Μ. Δούμας

13:30-14:00 Πρόεδρος: **Χ. Γράσσο**

Διαχείριση ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία σε ένδειξη
αγγειογραφικού ελέγχου
Γ. Παυλάκης

14:00-15:30 ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Λάθη και παραλείψεις

Πρόεδρος: **Ν. Μάτσας**

Περιστατικά: **Ε. Καλλίστρατος, Θ. Γιαλέρνιος, Α. Πιτταράς**

15:30-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή

17:00-17:30 Πρόεδρος: **Α. Πιτταράς**

Υπερουριχαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Μ. Παπαβασιλείου

17:30-18:00 Πρόεδρος: **Δ. Παπαδόπουλος**

Είναι όλα τα διουρητικά ίδια στη διαχείριση ασθενών με υπέρταση,
καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική δυσλειτουργία;
Χ. Γράσσο

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: **Θ. Γιαλέρνιος**

Οι σύγχρονες οδηγίες της κλινικής χρήσης των αντιαιμοπεταλιακών
στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη
Σ. Παπαϊωάννου

Σχόλια: **Α. Γαρδικιώτης**

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

18:30-19:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Δυσλιπιδαιμίες

Πρόεδρος: Κ. Κυφνίδης

Βέλτιστη κλινική διαχείριση ασθενών με δυσλιπιδαιμία σύμφωνα με την ιατρική των αποδείξεων και των κατευθυντήριων οδηγιών

Α. Πιτταράς, Χ. Γράσσο

Σχόλια: Λ. Στεργίου, Ι. Πασσιάς

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Χ. Γράσσο

Η διαδερμική αντιμετώπιση της στένωσης αορτής. Δόκιμη λύση και σε νεότερους πληθυσμούς;

Κ. Τούτουζας

20:00-21:30 *Πρόεδροι: Θ. Μακρής, Α. Πιτταράς*

Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες στη διαχείριση της υπέρτασης: τι αλλάζει στην καθημερινή κλινική πράξη, επιλογή φαρμάκων, ρόλος συνδυασμών. Κενά και προβληματισμοί πριν την αναθεώρησή τους

Μ. Δούμας, Χ. Γράσσο

Σχόλια: Μ. Παπαβασιλείου, Θ. Γιαλέρνιος

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

10:00-11:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κ. Κυφνίδης, Μ. Παπαβασιλείου, Χ. Γράσσο, Α. Πιτταράς

11:30-13:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ

13:30-14:00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ



PMI SCIENCE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

PMI Science — Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Philip Morris International (PMI) εργάζεται πάνω από μία δεκαετία για την ανάπτυξη **Προϊόντων Δυνητικά Μειωμένου Κινδύνου*** σε σύγκριση με το συμβατικό τσιγάρο

Αναπτύσσουμε ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων αξιολογώντας τα με τα πιο αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και μεθόδους

Στηρίζουμε την έρευνά μας στα πρότυπα Έρευνας και Ανάπτυξης φαρμάκων και σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών οργανισμών υγείας (π.χ. FDA)

www.pmiscience.com

**Προϊόντα Δυνητικά Μειωμένου Κινδύνου είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να αναφερθεί σε προϊόντα που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν μικρότερο κίνδυνο βλάβης για τους καπνιστές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά αντί να συνεχίσουν το κάπνισμα με συμβατικό τσιγάρο.*






zateven

ezetimibe+atorvastatin



Topress

OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Οδίοδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35
Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι | Τηλ.: 210 7488 821
Fax: 210 7488 827 | E-mail: info@winmedica.gr

COVADIR

Amlodipine / Valsartan

&

COVADIR HCT

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide



COVADIR/360/1 05/2022

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

[COVADIR](#)

[COVADIR HCT](#)

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 12/2021*

COVADIR F.C.TAB (5+160)MG/TAB BTx30 tabs: 7,71

COVADIR F.C.TAB (10+160)MG/TAB BTx30 tabs: 8,42

COVADIR HCT® F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB BTx30 tabs: 10,15

COVADIR HCT® F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB BTx30 tabs: 12,4

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά
ΟΛΕΣ οι αναπληρωτικές ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμετοχώντας την «ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΡΤΑ»

COVADIR HCT® F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB BTx30 tabs: 11,13

COVADIR HCT® F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx30 tabs: 12,61

COVADIR HCT® F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB BTx30 tabs: 20,25

*Σε περίπτωση ανακάλυψης νέου ΔΤ, θα ισχύσουν οι νεότερες.



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

www.demo.gr | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |

21° χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρυσνέρι,
Αττικής, Ελλάδα, Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587



NAVITOR™ TAVI SYSTEM

**SMART SEALING.
EXCEPTIONAL
HEMODYNAMICS.
UNCOMPROMISED
CORONARY ACCESS.
EXCELLENT STABILITY
AND ACCURACY.**

The smart PVL-sealing NaviSeal™ Cuff actively synchronizes to the cardiac cycle, seals, and mitigates PVL¹ by expanding to fill calcification-related gaps between the annulus and the valve.

ADVANCEDHEARTTHERAPIES.COM

30-DAY ECHO CORE LAB DATA¹

No moderate or severe PVL at 30-days based on echo core lab analysis.

80%
NONE/TRACE



20%
MILD

¹ Abbott data on file CL1014440.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs.

Abbott Vascular International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, B-1831 Diegem, Belgium

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

www.structuralheart.abbott

©2022 Abbott. All rights reserved. 9-EH-2-13397-01 05-2022




THE GOLD STANDARD FOR OVER 20 YEARS

OFTEN IMITATED, NEVER MATCHED

Unique design features
set the Amplatzer™ Talisman™
PFO Occluder apart from the rest.

DOWNLOAD NOW

Download the free
Amplatzer™ Portfolio App
from your favorite app store.



>94%
CLOSURE RATE†
at 6 months in
RESPECT trial¹

INTAGLIO™
WIRE TREATMENT

ASYMMETRIC
DOUBLE DISC
DESIGN*

DURABLE NITINOL
WIRE MESH WITH
POLYESTER
FABRIC THREAD

Abbott Vascular International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, B-1831 Diegem, Belgium, Tel: +32 2 714 14 11

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at eifu.abbottvascular.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott. Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.

† Effective closure

* Note: Only the 18mm size is not asymmetric.

¹ Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. Long-term outcomes of patent foramen ovale closure or medical therapy after stroke. *N Engl J Med* 2017; 377:1022-32

For more information, visit our web site at www.abbott.com

© 2022 Abbott. All rights reserved. 9-EH-2-13625-01 09-2022



ΕΠΙΔΡΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ



Το 1ο και μοναδικό φάρμακο με ένδειξη τόσο στην ΗFrEF όσο και στην ΗFrEF[†]§1-3

Κλινικά αποδεδειγμένα μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το κλάσμα εξώθησης[†]§1-3

Τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας. Απλή δοσολογία: μία φορά ημερησίως από του στόματος, χωρίς τιτλοποίηση.¹¹

Jardiance®
(εμπαγλιφλοζίνη)

[†]Το Jardiance 10mg ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.



Για την πλήρη λίστα ενδείξεων, αντενδείξεων, αντενδείξεων και λοιπών πληροφοριών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πλήρη Π.Χ.Π που είναι διαθέσιμη σκανάροντας το QR code ή πατώντας εδώ. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Ιατρικό τμήμα της εταιρείας.

Jardiance Π.Χ.Π.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010, EU/1/14/930/011, EU/1/14/930/012, EU/1/14/930/013, EU/1/14/930/014, EU/1/14/930/015, EU/1/14/930/016, EU/1/14/930/017, EU/1/14/930/018. Jardiance 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001, EU/1/14/930/002, EU/1/14/930/003, EU/1/14/930/004, EU/1/14/930/005, EU/1/14/930/006, EU/1/14/930/007, EU/1/14/930/008, EU/1/14/930/009 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαΐου 2014, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ιούλιος 2022. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΤΙΜΕΣ** JARDIANCE 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 35,71€, Ν.Τ.: 31,06€, Λ.Τ.: 49,21€. JARDIANCE 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 35,74€, Ν.Τ.: 31,09€, Λ.Τ.: 49,25€.

[†]Ενήλικες ασθενείς με χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (NYHA class II, III, ή IV) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (LVEF ≤ 40%). Ενήλικες ασθενείς με χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (NYHA class II, III, or IV) και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (LVEF > 40%).^{1,2}

[§]Στη μελέτη EMPEROR-Preserved, μια τυχαίοποιημένη κλινική μελέτη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με placebo 5988 ασθενών με ΗFrEF, συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του JARDIANCE 10 mg (n=2997) έναντι placebo (n=2991). Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης EMPEROR-Preserved ήταν το σύνθετο τελικό σημείο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ, αναλυόμενα ως το χρόνο για το πρώτο συμβάν. Οι ασθενείς που λάμβαναν JARDIANCE® σημείωσαν 21% μείωση του σχετικού κινδύνου για το κύριο τελικό σημείο (ARR=3,3%, NNT=31, HR=0.79; 95% CI: 0.69, 0.90; p<0.001). Στη μελέτη EMPEROR-Reduced, μια τυχαίοποιημένη κλινική μελέτη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με placebo 3730 ασθενών με ΗFrEF, συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του JARDIANCE 10 mg (n=1863) έναντι placebo (n=1867). Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης EMPEROR-Reduced ήταν το σύνθετο τελικό σημείο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ, αναλυόμενα ως το χρόνο για το πρώτο συμβάν. Οι ασθενείς που λάμβαναν JARDIANCE® σημείωσαν 25% μείωση του σχετικού κινδύνου για το κύριο τελικό σημείο (ARR=5,3%, NNT=19, HR=0.75; 95% CI: 0.65, 0.86; p<0.001).^{1,2}

¹¹Όταν το Jardiance συγχρηγείται σε συνδυασμό με σουλφονουρία ή ινσουλίνη, εξετάστε τη χορήγηση ελαττωμένης δόσης σουλφονουρίας ή ινσουλίνης για την αποφυγή του κινδύνου υπογλυκαιμίας.³

CI=confidence interval (διάστημα εμπιστοσύνης); ΚΑ=καρδιαγγειακός, ΗFrEF=heart failure with preserved ejection fraction, HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction fraction, ΝΚΑ=Νοσηλείες για Καρδιακή Ανεπάρκεια, LVEF=left ventricular ejection fraction; NYHA=New York Heart Association; RRR=relative risk reduction (ελάττωση σχετικού κινδύνου).

Βιβλιογραφία: 1. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al; EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385(16):1451-1461. (EMPEROR-Preserved results and the publication's Supplementary Appendix.) 2. Packer M, Anker SD, Butler J, et al; EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413-1424. (EMPEROR-Reduced results and the publication's Supplementary Appendix.) 3. JARDIANCE Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Ιούλιος 2022.

ARPLEXAM[®]

perindopril arginine, indapamide, amlodipine



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Arplexam 5 mg/1,25 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία [Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία] Arplexam 10 mg/2,5 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 3,395 mg περινδοπρίλης (perindopril) που αντιστοιχεί σε 5 mg περινδοπρίλης αργινίνης (perindopril arginine), 1,25 mg ινδαπαμίδης (indapamide) και 6,935 mg αμλοδιπίνης βεσουλικής (amlodipine besilate) που αντιστοιχεί σε 5 mg αμλοδιπίνης (amlodipine). [Ένα δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 3,395 mg περινδοπρίλης (perindopril) που αντιστοιχεί σε 5 mg περινδοπρίλης αργινίνης (perindopril arginine), 1,25 mg ινδαπαμίδης (indapamide) και 6,935 mg αμλοδιπίνης βεσουλικής (amlodipine besilate) που αντιστοιχεί σε 5 mg αμλοδιπίνης (amlodipine)]. [Ένα δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 6,790 mg περινδοπρίλης (perindopril) που αντιστοιχεί σε 10 mg περινδοπρίλης αργινίνης (perindopril arginine), 2,5 mg ινδαπαμίδης (indapamide) και 6,935 mg αμλοδιπίνης βεσουλικής (amlodipine besilate) που αντιστοιχεί σε 5 mg αμλοδιπίνης (amlodipine)]. [Ένα δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο περιέχει 6,790 mg περινδοπρίλης (perindopril) που αντιστοιχεί σε 10 mg περινδοπρίλης αργινίνης (perindopril arginine), 2,5 mg ινδαπαμίδης (indapamide) και 13,870 mg αμλοδιπίνης βεσουλικής (amlodipine besilate) που αντιστοιχεί σε 10 mg αμλοδιπίνης (amlodipine)]. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Arplexam 5 mg/1,25 mg/5 mg: λευκό, επίμηκες, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μήκους 9,75 mm και πλάτους 5,16 mm, χαραγμένο με το σήμα  στη μία πλευρά και  στην άλλη πλευρά.

Arplexam 5 mg/1,25 mg/10 mg: λευκό, επίμηκες, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μήκους 10,7 mm και πλάτους 5,66 mm, χαραγμένο με το σήμα  στη μία πλευρά και  στην άλλη πλευρά.

Arplexam 10 mg/2,5 mg/5 mg: λευκό, επίμηκες, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μήκους 11,5 mm και πλάτους 6,09 mm, χαραγμένο με το σήμα  στη μία πλευρά και  στην άλλη πλευρά.

Arplexam 10 mg/2,5 mg/10 mg: λευκό, επίμηκες, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μήκους 12,2 mm και πλάτους 6,46 mm, χαραγμένο με το σήμα  στη μία πλευρά και  στην άλλη πλευρά.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Φραγκοκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(-ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Arplexam (5+1,25+5) mg/tab: 73478/07-06-2019. Arplexam (5+1,25+10) mg/tab: 73479/07-06-2019. Arplexam (10+2,5+5) mg/tab: 73480/07-06-2019 Arplexam (10+1,25+10) mg/tab: 73481/07-06-2019 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 07/2022. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κ.Α.Κ. κατόπιν αιτήσεως

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό Προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

ARPLEXAM (10+2.5+10) MG, BT x 30 TABS 12,99 €

ARPLEXAM (10+2.5+5) MG, BT x 30 TABS 11,99 €

ARPLEXAM (5+1.25+10) MG, BT x 30 TABS 9,65 €

ARPLEXAM (5+1.25+5) MG, BT x 30 TABS 8,55 €

(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

SERVIER
moved by you

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

VE-22131-ARP-7/2022

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ρ.

Professor; Area: Exercise Physiology/Cardiometabolic Disease; End Degree: Ph.D., Exercise Physiology

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ο.

PhD, Κλινικός Ψυχολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Ψυχιατρική Κλινική, Υπεύθυνη Ψυχολόγος στη Μονάδα Παιδοενδοκρινολογίας του ΠΓΝΠ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Α.

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΝΙΜΙΤΣ

ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ Θ.

Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών, MSc Βιοστατιστικής, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΓΡΑΣΣΟΣ Χ.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

ΔΟΥΜΑΣ Μ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

Md, PhD, Εξειδικευμένη Υπέρτασιολόγος

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Μ.

MD, PhD, FESC, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» Βούλας, Αθήνα

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Α.

Διευθυντής Καρδιολογίας, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ Ι.

Καρδιολόγος

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Ν.

Md, PhD Ειδικός Υπέρτασιολόγος, ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» Βούλας, Αθήνα

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Κ.

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ι.

MD, PhD, FNSCOPE, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Συντονιστής Δ/ντής ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ", Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Γ.Ν.Α. "ΚΑΤ"

ΚΥΦΝΙΔΗΣ Κ.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ» Βούλας, Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου, Αθήνα

ΜΑΚΡΗΣ Θ.

Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου»

ΜΑΝΤΑΣ Ι.

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χαλκίδας

ΜΑΤΣΑΣ Ν.

Ειδικός Καρδιολόγος, M.sc, Αργίριο

ΝΕΓΚΟΥ Α.

Καρδιολόγος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

MD, PhD, Dip HIV Med, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ για τα Μεταδοτικά Νοσήματα

ΠΑΝΑΓΟΣ Χ.

Παθολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.

Καρδιολόγος FESC, EHS, Διευθύντρια Κέντρου Υπέρτασης-One Day Clinic Metropolitan General Hospital-Athens

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σ.

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ, Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

ΠΑΣΙΑΣ Ι.

Ιδιωτικός Καρδιολόγος

ΠΑΥΛΑΚΗΣ Γ.

Επεμβατικός Καρδιολόγος, ΓΝΑ ΚΑΤ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΙΤΤΑΡΑΣ Α.

Καρδιολόγος, *Clinical Hypertension Specialist*
ESH, Ass. Prof. George Washington University
Washington DC USA, Ιατρός ειδικού σώματος
επιτροπών αναπηρίας ΚΕΠΑ, Μέλος Επιτροπής
Φαρμακοεπαγρύπνησης ΕΟΦ, Διευθυντής Ιατρικού
Κέντρου MEDITON, Υπερτασικό Ιατρείο Metropolitan
General, Υπερτασικό Ιατρείο Καρδιολογική Κλινική
Ασκληπιείο Βούλας

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Λ.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού
εργαστηρίου, Καρδιολογική Κλινική Ασκληπιείο
Βούλας

ΣΚΛΗΡΟΣ Ε.

Δρ Γενικής Ιατρικής, Διευθυντής ΚΥ Νεμέας,
Πρόεδρος ΕΕΕΕΠ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Λ.

Καρδιολόγος

ΤΑΡΑΖΗΣ Σ.

Ιατρός, MD, PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δ/ντής ΕΟΦ στις Κλινικές Μελέτες

ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Α.

XXXXXXXX

ΤΣΟΥΚΑΣ Α.

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ»
Βούλας, Αθήνα

ΦΛΕΣΣΑΣ Δ.

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Δ.

Ειδικός Καρδιολόγος

ΧΑΣΑΠΗΣ Δ.

Διευθυντής καρδιολόγος στο ΚΥ Παγκρατίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω εταιρείες
για την υποστήριξη της εκδήλωσης:



Menarini Hellas





PP-XAR-GR-0461-1
02.2022



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto®

rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»