

Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ

Υπό την αιγίδα:

Της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.)

Της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου (Ε.ΔΙ.ΚΥ.)

Του Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.

Του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ / Web Scientific Event

"Εξελήξεις στο
Σακχαρώδη Διαβήτη:
Εφαρμογές για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και για
τους ειδικούς"

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Αλεξανδρούπολη

Ξενοδοχείο Ramada Plaza by Wyndham Thraki

Θα χορηγηθούν 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. • Congress World

📍 Μιχαήλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα • ☎ 210 7210001, 210 7222518, 📠 210 7210051

🌐 www.congressworld.gr • ✉ info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

*Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μόνιμη πανδημία. Αυξάνει τη νοσηρότητα, μειώνει το προσδόκιμο της ζωής και ευθύνεται για σοβαρές οξείες και χρόνιες επιπλοκές. Οι τελευταίες γίνονται ολοένα και πιο κατανοητές, αλλή η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους επιδέχονται μεγάλη βελτίωση. Προς την κατεύθυνση αυτήν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι νεότερες πρακτικές εφαρμογές, μερικές από τις οποίες απευθύνονται σε εξειδικευμένα κέντρα, ενώ άλλες ήδη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτές οι εξελίξεις και εφαρμογές αποτελούν το θέμα της επιστημονικής διαδικτυακής μας εκδήλωσης (web based scientific event) το **Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021**.*

Σας προσκαλούμε και ελπίζουμε ότι, με τη δική σας συμμετοχή, η επιστημονική μας εκδήλωση θα έχει ιδιαίτερη επιτυχία.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Νικόλαος Παπάνας

Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη

Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού

Β' Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού

Δημήτριος Παπάζογλου

Καθηγητής Παθολογίας

Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

10:00-11:00 **ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**

Πρόεδροι: Δημήτριος Παπάζογλου, Νικόλαος Παπάνας

10:00-10:15 Προϊόντα τελικής γήυκοζυλίσωσης του δέρματος και διαβητική νευροπάθεια
Στέλλα Παπαχρήστου

10:15-10:30 Παγιδευτικές νευρίτιδες στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Ηλιάνα Σταματίου

10:30-10:45 Γήυκαϊμικός δείκτης και γήυκαϊμικό φορτίο: Συνδέονται με τη διαβητική
μικροαγγειοπάθεια;
Θεανώ Πενλίούγλου

10:45-11:00 Μεταβολική νόσος του ήπατος στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Καλλιόπη Παφίηη

11:00-11:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Μαρία Πανοπούλου

Μοριακές τεχνικές και νεότερες εξελίξεις στην υπηρεσία της διάγνωσης των
λοιμώξεων στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Μαρία Δημητρίου

11:15-11:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Ευστράτιος Μαητέζος

Οι κυριότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων στο Σακχαρώδη
Διαβήτη
Περικλής Παναγόπουλος

11:30-11:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Μάρθα Ανδρέου

Σύνδρομο ευθραυστότητας και Σακχαρώδης Διαβήτης
Μαρία Γκάμπρα

11:45-12:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κυργιάννης

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 σε ανδρόγυνα
Κυριακούλα Τσοιάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

12:00-12:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Στυλιανός Κακοθύρης

Σακχαρώδης Διαβήτης και καρκίνος του γαστρεντερικού συστήματος
Αναστασία Θανοπούλου

12:15-12:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Άγγελος Παππάς

Αγγειακές βλάβες από το κάπνισμα στο Σακχαρώδη Διαβήτη
Δημήτριος Σκούτας

12:30-13:30 **ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Πρόεδροι: Γεώργιος Δημητριάδης, Νικόλαος Παπάνας

Η φαρέτρα των αντιδιαβητικών αγωγών

Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Αλγόριθμος αντιδιαβητικής αγωγής στο ΣΔτ2

Σταύρος Λιάτης

13:30-14:30 **ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ**

Πρόεδροι: Πολύκαρπος Ευριπίδου, Μιχαήλ Ζουβάνης

Σακχαρώδης Διαβήτης επαγόμενος από χημειοθεραπεία

Άγγελος Κυριάκου

Το άτομο με προδιαβήτη

Μάριος Μιχαήλ

Διαβητική νεφροπάθεια: Πώς γίνεται ο προληπτικός έλεγχος και πότε παραπέμπω στον ειδικό;

Δημήτριος Δημητρίου

14:30-15:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπάνας

Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Νίκη Κατσίκη

15:00-16:15 **ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16:15-16:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Μιχαήλ Κατωτομιχελάκης

Η οσφρητική δυσλειτουργία στο σακχαρώδη διαβήτη

Ευανθία Γκούβερη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

16:30-16:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Πηνή Περδικάκη

Η υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Πέτρος Γλούφτσιος

16:45-17:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Χρήστος Γαλανάκης

Βασικές αρχές αυτομέτρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου

17:00-17:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Στέφανος Παπαντωνίου

Σακχαρώδης Διαβήτης και εργασία

Ευαγγελία Νένα

17:15-17:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Ηλίας Μυγδάλης

Νεότερες οδηγίες για τη μείωση της LDL στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

17:30-17:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Λεωνίδας Λαναράς

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Αικατερίνη Τερζούδη

17:45-18:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπάζογλου

Νεότερα στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Δημήτριος Τζιακάς

18:00-18:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπάνας

Double diabetes mellitus

Djordje Popovic

18:15-18:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Manfredi Rizzo

Association between Vitamin D insufficiency and metabolic syndrome

Anca Pantea Stoian

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

18:30-18:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Peter Kempler**

Periodontal disease in diabetes mellitus

Tamas Varkonyi

18:45-19:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Νικόλαος Παπάνας**

Diabetic neuropathy: What is new in 2021?

Dan Ziegler

19:00-19:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Γεώργιος Δρόσος**

Novel procedures to save limbs in diabetes

Jose-Luis Lazaro-Martinez

19:15-19:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Σουητάνα Κύρογλου**

Σακχαρώδης Διαβήτης και γενετήσια συμπεριφορά

Βασιλική Κυργιαννάκη

19:30-19:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Νικόλαος Παπάνας**

Ενδοαυλική επαναγγείωση κάτω άκρων στο Σακχαρώδη Διαβήτη: Τι νεότερο

Γεώργιος Γεωργιάδης

19:45-20:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Μιχαήλ Πιτιακούδης**

Η πηλαστική χειρουργική στην υπηρεσία του διαβητικού ποδιού το 2021

Δέσποινα Κακαγιά

20:00-20:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Δημήτριος Παπάζογλου**

Μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: Ποιες οι σύγχρονες εφαρμογές τους στην ΠΦΥ;

Εριφύλη Χατζηαγγελιάκη

20:15-20:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: **Χρήστος Μανές**

Διαβήτης έπειτα από τη μεταμόσχευση οργάνων

Νικόλαος Τεντολούρης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

20:30-20:45 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Απόστολος Τσάπας

Διαβητική νεφροπάθεια: Νεότερες εξελίξεις με τη βοήθεια των SGLT-2 αναστολέων
Βασίλειος Τσιμιχόδημος

20:45-21:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπάζογλου

Σακχαρώδης Διαβήτης και σύνδρομο απνοιών κατά τον ύπνο
Πασχάλης Στειρόπουλος

21:00-21:15 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Πρόεδρος: Αθανάσιος Συμεωνίδης

Σακχαρώδης Διαβήτης και κατάθλιψη
Θεοφάνης Βορβολάκος

21:15-21:45 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Πρόεδροι: Χρήστος Μανές, Δημήτριος Παπάζογλου, Νικόλαος Παπάνας

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην κοινωνία

Δήμητρα Μπαδιανούδη, Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, Ιωάννης Πετρίδης

21:45

Κλείσιμο-απολογισμός

Δημήτριος Παπάζογλου, Νικόλαος Παπάνας



forxiga®

(dapagliflozin) 10mg



Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος επισκεφθείτε το <http://medicalinformation.astrazeneca.gr/home/product-label.html#list-anchoring-F> ή ζητήστε το από τη γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

AstraZeneca 

AstraZeneca A.E.,
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500, Fax: 210 6859195
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28
N.T. 28,75€ / Λ.Τ. 45,53€



Ο ασθενής
στο επίκεντρο των
δράσεών μας

TRIPLIXAM®
περινδοπρίλη αργινίνη ινδαπαμίδα αμλοδιπίνη

COVERAM®
περινδοπρίλη αμλοδιπίνη

Lipocomb®
Rosuvastatin + Ezetimibe

TRIPLIXAM (5+1,25+5) mg/tab ΑΤ: €8,55, **TRIPLIXAM** (5+1,25+10) mg/tab: ΑΤ €9,65, **TRIPLIXAM** (10+2,5+5) mg/tab: ΑΤ €12,89, **TRIPLIXAM** (10+2,5+10) mg/tab: ΑΤ €13,78, **LIPOCOMB** 10/10 mg/tab: ΑΤ €26,77, **LIPOCOMB** 20/10 mg/tab: ΑΤ €29,45, **COVERAM** (5+5) mg/tab Α.Τ: €6,92, **COVERAM** (5+10) mg/tab Α.Τ: €6,97, **COVERAM** (10+5) mg/tab Α.Τ: €10,46, **COVERAM** (10+10) mg/tab Α.Τ: €10,52

- Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων που διατίθενται από τον ΚΑΚ.

* **Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:** EGIS Pharmaceuticals PLC, 1106 Budapest, Kereszturi ut.30-38, Ουγγαρία
Τοπικός αντιπρόσωπος και διανομέας: Servier Hellas, Φραγκακλινιάς 7, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 93 91 000



SERVIER HELLAS
Φραγκακλινιάς 7, 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210 9391000
www.servier.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα **Φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Kempfer Peter	MD, PhD, DSc, Professor of Medicine at the Dept of Medicine and Oncology, Semmelweis University, Budapest, Past Chairman of Neurodiab, President Elect of the Central European Diabetes Association
Lazaro-Martinez Jose-Luis	Professor of Podiatric Surgery, Complutense University, Madrid
Popovic Djordje	Assistant Professor in Internal Medicine, University of Novi Sad
Rizzo Manfredi	Prof., MD, PhD, Associate Professor of Internal Medicine, University of Palermo, Italy Affiliate Associate Professor of Internal Medicine, University of South Carolina, USA
Stoian Anca Pantea	Associate Professor of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Carol Davila University, Bucharest, Romania
Varkonyi Tamas	Professor of Internal Medicine, University of Szeged
Ziegler Dan	MD, FRCPE, Professor of Internal Medicine, Institute for Clinical Diabetology, German Diabetes Centre, Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany, Dr. h.c. Democritus University of Thrace
Ανδρέου Μάρθα	MSc, Διευθύντρια Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, Συντονίστρια Διευθύντρια ΚΥ Αβδηρών Ξάνθης
Βορβολάκος Θεοφάνης	Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής, Ψυχιατρική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Γαλανάκης Χρήστος	MD, PhD, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, SCOPE certificate by the World Obesity Federation, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ)
Γεωργιάδης Γεώργιος	Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Γκάμπρα Μαρία	Ειδικός Γενικός Ιατρός, Περιφερικό Ιατρείο Κιμμερίων
Γκούβερη Ευανθία	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ΔΠΘ, MSc, Diabetes Center Dr. Tews, Gelnhausen, Germany

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Γλούφτσιος Πέτρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Διδυμοτείχου
Δημητριάδης Γεώργιος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας, Μεταβολικών Παθήσεων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Δημητρίου Δημήτριος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Ταμίας Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος
Δημητρίου Μαρία	Ειδικός Βιοπαθολόγος, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ», Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, Επιστ. Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Δρόσος Γεώργιος	Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΔΠΘ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Ευριπίδου Πολύκαρπος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Διαβήτη, Επίτιμος Λέκτορας St George's University of London - Institute of Medical and Biochemical Education, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μέλος Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού, Κύπρος
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος	Ειδικός Γενικός Ιατρός, Περιφερικό Ιατρείο Μεταξάδων
Ζουβάνης Μιχαήλ	Ενδοκρινολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου (Ε.ΔΙ.ΚΥ.)
Θανοπούλου Αναστασία	Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κακαγιά Δέσποινα	Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Κακοθύρης Στυλιανός	Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Κατσίκη Νίκη	Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ιατρείο Παχυσαρκίας - Λιπιδίων, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
Κατωτομιχελάκης Μιχαήλ	Αν. Καθηγητής ΩΡΛ, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Κυργιαννάκη Βασιλική	Νοσηλεύτρια ΤΕ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Κυργιάννης Αθανάσιος	Διευθυντής Γενικής Ιατρικής, ΚΥ Ορεστιάδας
Κυριάκου Άγγελος	Ενδοκρινολόγος, MD, FRCT, Διαβήτης επαγόμενος από χημειοθεραπεία, European University of Cyprus
Κύρογλου Σουλτάνα	Επισκέπτρια Υγείας, τ. Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Λαναράς Λεωνίδας	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής - Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, ΓΝ Λαμίας
Λιάτης Σταύρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπ. Πανεπιστημιακή Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος	Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων
Μακρυλάκης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Ματτέζος Ευστράτιος	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΔΠΘ
Μανές Χρήστος	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Διαβητικού Ποδιού, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος Ελλάδος στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας στο Διαβητικό Πόδι

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μιχαήλ Μάριος	Παθολόγος-Διαβητολόγος, Γραμματέας Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου
Μπαδιανούδη Δήμητρα	Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Α΄, ΚΥ Ορεστιάδας
Μυγδάλης Ηλίας	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.
Νένα Ευαγγελία	Αν. Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής - Κοινωνικής Ιατρικής - Ιατρικής Εργασίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ
Παναγόπουλος Περικλής	Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Πανοπούλου Μαρία	Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπαζαφειροπούλου Αθανασία	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc στη Βιοστατιστική, Επιμελήτρια Α΄, Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Παπάζογλου Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπάνας Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παπαντωνίου Στέφανος	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη και την Ηπατολογία, Υπεύθυνος Διαβητολογικού-Ηπατολογικού & Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, ΓΝ Καβάλας
Παπαχρήστου Στέλλα	Ειδικεύομενη Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Παππάς Άγγελος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής, Διαβητολογικό Κέντρο, Βενιζέλειο Πανάνειο ΓΝ Ηρακλείου Κρήτης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Παφίλη Καλλιόπη	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Διδάκτωρ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης και German Diabetes Centre, Dusseldorf
Πενθιογίου Θεανώ	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Περδικάκη Πηνή	Ειδικός Γενικός Ιατρός, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Άστρους Κυνourίας, Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών
Πετρίδης Ιωάννης	Παθολόγος, Αντιπρόεδρος ΣΥ.Δ.Ν.Ε.
Πιττακούδης Μιχαήλ	Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Σκούτας Δημήτριος	Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Επιστημονικός Διευθυντής Γεν. Κλιν. Λυσ. Σαραφianός Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνος Παθολογικού Τομέα ΚΑΑ Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδος
Σταματίου Ηλιάννα	Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Στειρόπουλος Πασχάλης	Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
Συμεωνίδης Αθανάσιος	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Γεν. Γραμματέας ΔΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Τεντολούρης Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου & Ερευνητικού Διαβητολογικού Εργαστηρίου, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τερζούδη Αικατερίνη

Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης

Τζιακάς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης

Τσάπας Απόστολος

Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Τσιμικόδημος Βασίλειος

Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β΄ Παν/μιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων

Τσολάκη Κυριακούλα

Γενικός Ιατρός, Επιμελήτρια, ΚΥ Σαπών

Χατζηαγγελιάκη Εριφύλη

Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Β΄ Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας - Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου

Vipidia®

αλογλιπτίνη

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	15,47 €
VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	19,16 €
VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB BTx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+850)mg/TAB BTx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+1000)mg/TAB BTx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,59 €
INCRESYNC F.C.TAB (25+30)mg/TAB BTx28 (NYL/alu/PVC blister)	37,98 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφερτε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Δικαιούχος Σήματος και
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Takeda Hellas S.A.
Green Plaza, Building B'
59-61 Ag. Konstantinou Str.
Marousi, 15124, Athens - Greece
Tel.: +30 210 6387810
Fax: +30 210 6387801
www.takeda.com

Προώθηση:



ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστίας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα:

ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις ΑΕ - Congress World

Μιχαηλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

τηλ.: 210 72 10001, 210 72 10052, 210 72 10025, Fax: 210 72 10069

www.congressworld.gr, email: info@congressworld.gr

Χώρος πραγματοποίησης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά και η αναμετάδοση θα γίνει από την Αλεξανδρούπολη - Ξενοδοχείο RAMADA PLAZA by WYNDHAM THRAKI

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 8 Μόρια (Credits) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EECCME-UEMS) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (SIIME/CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου. Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του 60% του συνόλου των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο την online παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης και θα συνοπολογιστούν για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (E-certificate).

Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να γίνει 3 μέρες μετά από τη λήξη του Σεμιναρίου, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες που θα παραλάβουν στο email της εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.

Βοηθήστε τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

ΟΖΕΜΠΡΙC® - Ο ΝΕΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

στη διαχείριση των αρρυθμιστών ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Ozempic® - Εβδομαδιαίος αγωνιστής υποδοχής GLP-1 που συνδυάζει ανώτερη αποτελεσματικότητα* στη μείωση της HbA1c και του σωματικού βάρους και καρδιαγγειακό[‡] όφελος.^{1-5,7,8,9}

**ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ^{1-5,7,8,9*}**

**ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΕΝΟ[‡]
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ^{5‡}**

**ΑΝΩΤΕΡΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ
ΑΠΟΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ^{1-5,7,8,9*}**

*Τα αποτελέσματα αφορούν το Ozempic® σε όλες τις συγκριτικές μελέτες SUSTAIN, οι οποίες περιείχαν τον εικονικό φάρμακο, τη σταγηνίλη, τη νιουαλογλιτίνη, την εξένατιν ER, την ινσουλίνη glargine U100, την καναφιλοζίνη και τη λιραγλιτίνη.^{1,2,7,8}



Για ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που υπερισχύει η αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος (ασθενείς με δείκτες υψηλού κινδύνου για ASCVD ή εγκατεστημένη ASCVD).[†]

Το Consensus Report των ADA/EASD 2019 συνιστά τη θεραπεία με αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1 με αποδεδειγμένο[‡] καρδιαγγειακό όφελος[‡]

Το Ozempic® (σεαμγλιουτίνη) έχει ένδειξη για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό με διαίτα και άσκηση.

Το μοντέλο δεν είναι πραγματικός ασθενής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ως παράρτημα «Ανεπιθύμητες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. **ΘΝΩΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ozempic® 0,25 mg, Ozempic® 0,5 mg, Ozempic® 1 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένος **ΠΟΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ** Ένα ml διαλύματος περιέχει 1,34 mg σεαμγλιουτίνης. Ozempic® 0,25 mg: Μια προγεμισμένη συσκευή τύπου πένος περιέχει 2 mg σεαμγλιουτίνης, ¹ 5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 0,25 mg σεαμγλιουτίνης σε 0,19 ml διαλύματος. Ozempic® 0,5 mg: Μια προγεμισμένη συσκευή τύπου πένος περιέχει 2 mg σεαμγλιουτίνης ² 5 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 0,5 mg σεαμγλιουτίνης σε 0,37 ml διαλύματος. Ozempic® 1 mg: Μια προγεμισμένη συσκευή τύπου πένος περιέχει 4 mg σεαμγλιουτίνης ³ 3,0 ml διαλύματος. Κάθε δόση περιέχει 1 mg σεαμγλιουτίνης σε 0,74 ml διαλύματος. **Ανάλυση της ανθρωπίνης ορμόνης «γλυκαγόνη» (γλυκαγόνη) (GLP-1):** που παρακολουθείται με χρήση της τεχνολογίας αντανάκλασης DNA σε κύτταρα *Saccharomyces cerevisiae*. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Ozempic® ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν ελέγχεται επαρκώς σε συνδυασμό με διαίτα και άσκηση ⁴ ή μονοθεραπεία ή με μεταformίνη θεραπεία σταθμισμένης έκτασης δοσολογίας ή αντανάκλασης ⁵ σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ισοδύναμη Η αρχική δόση είναι 0,25 mg σεαμγλιουτίνης μία φορά εβδομαδιαίως. Μετά από 4 εβδομάδες, η δόση πρέπει να αυξηθεί στα 0,5 mg μία φορά εβδομαδιαίως. Μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες με δόση 0,5 mg μία φορά εβδομαδιαίως, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 1 mg μία φορά εβδομαδιαίως προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο γλυκαιμικός έλεγχος. Η σεαμγλιουτίνη 0,25 mg δεν αποτελεί δόση συντήρησης. Εβδομαδιαίως, δόσεις μεγαλύτερες του 1 mg δεν συνιστώνται. Όταν το Ozempic® προστίθεται σε υπάρχουσα ινσουλίνη με μεταformίνη ή μεαζολινιδόνη ή σε συνδυασμό 2 σωματοστατα νατρίου-γλυκονίλης (GLYT2), η τρέχουσα δόση μεταformίνης ή/και μεαζολινιδόνης ή συνδυασμού GLYT2 πρέπει να διατηρηθεί αμετάβλητη. Όταν το Ozempic® προστίθεται σε υπάρχουσα αγωγή με σουλιναλινιδόνη ή ινσουλίνη, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της σουλιναλινιδόνης ή της ινσουλίνης για τη μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας. Δεν είναι αναγκαία η αυτοπροσαρμογή των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα για τη ρύθμιση της δόσης του Ozempic®. Η αυτοπροσαρμογή των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της δόσης της σουλιναλινιδόνης και της ινσουλίνης. **Εκεί που είναι το Ozempic® και μενίσματα ή μινίσματα.** Συνιστάται μια προσαρμογή σταδιακής μείωσης της ινσουλίνης. **Παράλληλη χρήση:** Δεν παραλείβεται η χρήση, αυτή πρέπει να χορηγείται το απογευματινό δυνατό και εντός 5 ημερών από την παράληψη της δόσης. Δεν έχουν παραβλεπθεί περικοπές από 5 ημέρες, η δόση πρέπει να παραλείπεται οριστικά και η επόμενη δόση να χορηγείται κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής μπορεί να είναι να ονομάζεται το δείκτης προγράμματος χορήγησης της ίδιας φαρμακευτικής. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Ημερήσια δόση 0,25 mg σεαμγλιουτίνης σε ασθενείς ηλικίας 75 ετών είναι περισσότερο. **Νευρική δυσκαμψία:** Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νευρική δυσκαμψία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεαμγλιουτίνης σε ασθενείς με σοβαρή νευρική δυσκαμψία είναι περιορισμένη. Η σεαμγλιουτίνη δεν αντιστέκεται για χρήση σε ασθενείς με νεφροπάθεια τελικού σταδίου. **Ηπατική δυσκαμψία:** Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια δυσκαμψία. Η εμπειρία με τη χρήση της σεαμγλιουτίνης σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσκαμψία είναι περιορισμένη. **Πρέπει να επιβεβαιώνεται προηγουμένως κατά τη χορήγηση:** θεραπεία με σεαμγλιουτίνη σε αυτούς τους ασθενείς. **Παθολογία:** Η σεαμγλιουτίνη ή ασφαλεία και αποτελεσματικότητα της σεαμγλιουτίνης σε παθολογία ημικλινική και ημικλινική 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. **Τρόπος χορήγησης:** Το Ozempic® χορηγείται μία φορά εβδομαδιαίως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς φαγητό. Το Ozempic® χορηγείται υποδοχικά με έναν σταγονόμετρο του μολύβι ή του άκρου του βραχίονα. Η θέση της ένεσης μπορεί να αλλάξει χωρίς προσαρμογή της δόσης. Το Ozempic® δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφθάλμια ή ενδοαμνιακή. Η ήπια ή μέτρια εβδομαδιαία χορήγηση μπορεί να αλλάξει, εάν είναι απαραίτητο, εφόσον το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο δόσεων είναι τουλάχιστον 3 ημέρες (>72 ώρες). Μετά την επιλογή ενός νέου σημείου χορήγησης, πρέπει να αναμενεται το επόμενο προεπιλεγμένο σημείο χορήγησης. **Αντενδείξεις:** Υπερσенсиτιβότητα στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Εξέταση προετοιμασίας και χορήγησης κατά τη χρήση:** Η σεαμγλιουτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία

πεί της διαβητικής κετοξέωσης. Η σεαμγλιουτίνη δεν είναι υποκατάστατο της ινσουλίνης. Έχει αναφερθεί διαβητική κετοξέωση σε ινσουλινοεξαρτημένους ασθενείς που προχώρησαν σε ταχεία διακοπή ή μείωση της δόσης της ινσουλίνης κατά την έναρξη της θεραπείας με αγωνιστή υποδοχέα GLP-1. Δεν υπάρχει εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας IV (ο όγκος με την πρόληψη κατά NYHA (New York Heart Association) και επόμενες ή σεαμγλιουτίνη δεν αντιστέκεται σε αυτούς τους ασθενείς. **Επιδείξεις στα χαρτοφυλάκια:** Η χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 μπορεί να συσχετιστεί με ανεπιθύμητες ενέργειες στο γαστροεντερικό σύστημα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση της θεραπείας σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία καθώς η ναύτα, ο έμετος και η διάρροια μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. **Οξεία παγκρεατίτιδα:** Έχει παρατηρηθεί οξεία παγκρεατίτιδα κατά τη χρήση αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1. Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για το ποσοστό εμφάνισης αυτής της οξείας παγκρεατίτιδας. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η σεαμγλιουτίνη πρέπει να διακοπεί. Εάν επιβεβαιωθεί, η θεραπεία με σεαμγλιουτίνη δεν πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Πρέπει να γίνεται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό παγκρεατίτιδας. **Συγγλυμμία:** Οι ασθενείς που λαμβάνουν σεαμγλιουτίνη σε συνδυασμό με σουλιναλινιδόνη ή με ινσουλίνη ενδέχεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας μπορεί να ελαττωθεί με μείωση της δόσης της σουλιναλινιδόνης ή της ινσουλίνης κατά την έναρξη της θεραπείας με σεαμγλιουτίνη. **Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια:** Σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη και σεαμγλιουτίνη, έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης επιλοκών διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Πρέπει να επιβεβαιώνεται προηγουμένως κατά τη χρήση σεαμγλιουτίνης σε ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που λαμβάνουν ινσουλίνη. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να λαμβάνουν θεραπεία σύμφωνα με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η ταχεία βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωρινή επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, όμως δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλα μηχανισμοί. **Παρενέργειες σε υγρό:** Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή πρακτικά στερεά νατρίου. **Χρησιμοποιείται Προκείμενο:** να βελτιωθεί η χρησιμοποίηση των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με φάρμακα. **Γνωστήρια, κούραση και γαργαλιση:** Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία συνιστάται να χρησιμοποιούν αντισυλληπτική κατά τη διάρκεια της θεραπείας με σεαμγλιουτίνη. Η σεαμγλιουτίνη δεν επηρεάζει την γονιμότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η θεραπεία με σεαμγλιουτίνη πρέπει να διακοπεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν από μια προγραμματισμένη εγκυμοσύνη λόγω του μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής. Η σεαμγλιουτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η επίδραση της σεαμγλιουτίνης στην ανάπτυξη γυναικείας είναι άγνωστη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πολύ συχνές: Υπογλυκαιμία όταν χρησιμοποιείται με ινσουλίνη ή σουλιναλινιδόνη, ναύτα, διάρροια, Σπινική Υπογλυκαιμία όταν χρησιμοποιείται με άλλα από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα, μεσμερήια υπνηλία, ζάλη, επιποθείς, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, έμετος, κοιλιακό άλγος, δύσπνοια, κοιλιακή δυσκαμψία, δυσπεψία, ναυτία, γαστροοισοφαγική παλινδρομική, ερμη, μετεωρισμός, γαλακτοστάση, κόπωση, αυξημένη λιπώδης, αυξημένη αμυλώδης, μείωση σωματικού βάρους. Όχι συχνές: Υπερσенсиτιβότητα, διαμεσολαβούμενος αλλεργικός ρινίτις, οξεία παγκρεατίτιδα, αντανάκλαση της θέσης ένεσης, Σπινική, Αναφυλακτική αντίδραση. Μην γνωρίζετε: Αγγειοοίδημα διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αντοχή πιθανολογείται σε ασθενείς με ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τη χορήγηση άλλων κυκλοφορούντων φαρμακευτικών προϊόντων είναι σπάνια. **Εμπειρία της πρώτης παρακολούθησης της σχέσης οφελούς κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Λογιστική, Αθήνα, Τηλ + 30 21 3204380/337, Φαξ + 30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.emea.europa.eu>), για την Ελλάδα, ή στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, Τηλ +357 22686807, Φαξ +357 22686869, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/hyg, για την Κύπρο, **ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Δανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:** GR/17/1251/002-006 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 08 Φεβρουαρίου 2018. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 03/03/2021. **Λογιστική:** Η λογιστική των πληροφοριών για το προϊόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην πλήρη Περιγραφή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, διαθέσιμη με κτηνή συνταγή, Α.Τ. 124.31 €.

ADA-Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, EASD-Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Μελέτη του Διαβήτη, GLP-1=γλυκαγόνη υποδοχική πεπτιδίνη-1. [‡]Τμήμα SUSTAIN 6, το Ozempic® μείωσε τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (θάνατος από καρδιαγγειακό αίμα, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο), συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι είχαν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, επιρροήθηκε της πρότυπης φροντίδας. Το αποτέλεσμα της μελέτης καρδιαγγειακής έρευνας SUSTAIN 6 του Ozempic® βρίσκεται στην παραγράφου 5.1 της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Καρδιαγγειακή νόσος). [‡]Σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 μια υψηλή καρδιαγγειακή νόσος. **Αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος** σημαίνει ότι έχει επίσημη ένδειξη μείωσης καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Βιβλιογραφία: 1. Ozempic®, Περιγραφή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (03/2021). 2. Pratley RE, Lingway L, et al; SUSTAIN 7 Investigators. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2017;6(4):275-286. 3. Ahlmann A, et al; SUSTAIN 6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2018;379(19):1834-1844. 4. Buse JB, Wexler DJ, Tosas A, et al; 2019 update to: management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care*. 2020;43(2):487-493. 5. Lingway L, Catargiu AM, Frias JP, et al; Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily canagliflozin as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 8): a double-blind, phase 3a, randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2019;7(8):834-844. 6. Capehorn MS, Adams AM, Catargiu AM, Furlberg JK, et al; Efficacy and safety of once-weekly semaglutide 1.0 mg vs on-metformin 1.0 mg vs add-on to 1-3 oral antidiabetic drugs in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 10). *Diabetes Metab*. 2020;46(2):100-109.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις Φαρμακευτικές Εταιρείες
για τη συμβολή τους στην επιτυχία της Εκδήλωσης



Januvia
(sitagliptin, MSD)

Janumet
(sitagliptin/metformin, MSD)



1. SmPC JANUVIA, SmPC JANUMET

Για την πλήρη περιληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος.
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Αλιμος. Τηλ.: 210 9897 300

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και **ανανεώστε ΟΛΕΣ**
τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

JANUMET (50+1000) ΛΤ: 35,43€, JANUMET (50+850) ΛΤ: 44,33€, JANUVIA (100) ΛΤ: 33,68€, JANUVIA (50) ΛΤ: 24,70€



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΛΟΗΡΩΣΗΣ:
Merck Sharp & Dohme S.V., Waarderweg 39,
2031 BN Haarlem, Ολλανδία
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Ε.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος, 174 56, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000
Τηλ: 2109897300
www.msd.gr
E-MAIL: dpar_greece@merck.com



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΑΝΚΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνπρόσθηξη και διανομή:

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατσοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mail@bianex.gr
• WEBSITE: www.bianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,
562 24 Έκτορας Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000